

Version 01.2024

APPÂT RODENTICIDE À BASE DE DIFÉNACOUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol Liquide Visqueux Pâteux Solide

- **SUPPORT** : Bloc paraffiné
- **SUBSTANCES ACTIVES** : 0.005% Difénacoum
- **AMÉRISANT** : 0.001% de dénatonium benzoate
- **NUMÉRO AMM** : FR-2013-0105
- **CONDITIONNEMENT** : bloc de 40g en seau de 10kg

PROPRIÉTÉS :

- Anticoagulant.
- Agit par ingestion répétée.
- Antidote : vitamine K1 par du personnel médical / vétérinaire uniquement.
- TP14.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Traitement à l'intérieur, à l'extérieur autour des bâtiments, en zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries.

MODE D'EMPLOI :

- Lutte contre les rats : 60 à 100g par **DUOMATRAT** espacé de 5 à 10m.
- Lutte contre les souris : 40g par **DUOMATSOURIS** espacé de 5 à 10m.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début de traitement et au moins 1 fois par semaine par la suite.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement. Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. Protéger l'appât des conditions atmosphériques.
- Placer les points d'appâts dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non ciblées.
- Vérifier régulièrement la consommation et renouveler les appâts consommés ou souillés jusqu'à ce que la consommation cesse.
- Retirer les appâts en fin de traitement et ne retraiter qu'en cas de nouvelle infestation.
- Ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

**Utilisez les rodenticides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes
et les informations concernant le produit.**

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.